“Le infezioni da Trichomonas vaginalis”

B. Pieretti
Laboratorio di Patologia Clinica, Ospedale Santa Croce Fano, A. O. Ospedali Riuniti Marche Nord

L’infezione da *Trichomonas vaginalis* (TV) è un’infezione sessualmente trasmissibile che colpisce moltissime donne in tutto il mondo. Non è una patologia grave, ma non va comunque sottovalutata, perché può provocare sintomi fastidiosi, e in caso di gravidanza è associata a un alto rischio di complicazioni e di parto pre-termine.
Il Tv è un protozoo diffuso in tutto il mondo, estremamente comune in particolare nelle aree industrializzate. La trasmissione avviene principalmente per via sessuale (effetto “ping pong”).
Il rischio di contrarre la trichomoniasi vaginale è legato a fattori predisponenti (es. stress, terapia antibiotica, ecc) che comportano un’alterazione delle difese dell’ambiente vaginale con conseguente diminuzione della presenza di lattobacilli e proliferazione di microorganismi patogeni.
La vaginite da Tv è nel 10-50% dei casi frequentemente asintomatica; la sintomatologia quando presente è caratterizzata da prurito, abbondanti perdite di colore giallastro, maleodoranti e di consistenza schiumosa.
E’ stata dimostrata l’associazione dell’infezione da Tv con un maggiore rischio di contrarre l'HIV nel caso si venga esposti al virus
L’indagine di laboratorio, per la ricerca diretta del protozoo, può essere eseguita con test diagnostici diversi (es. esame microscopico, colturale, point of care, indagini molecolare) che variano molto in termini di sensibilità, specificità, economicità e tempi di risposta.